

**Pacet**  
Extra

Comprimés

## IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT :

### •Composition Quantitative :

Pour 01 comprimé

Paracétamol : ..... 500 mg

Caféine : ..... 65 mg

Excipients : ..... QS

### •Composition Qualitative :

**Substances Actives :**Paracétamol & caféine.

**Excipients :**Crospovidone, Avicel, Stéarate de Magnésium, Aerosil, Povidone.

### •Forme Pharmaceutique et Présentation :

Boite de 16 comprimés.

### •Classe Pharmaco-Thérapeutique :

Antalgique et antipyrétique.

## DANS QUELS CAS POUVEZ-VOUS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

PACET EXTRA est indiqué pour soulager les douleurs d'intensité légère à modéré tels : les maux de tête, la migraine, mal de gorge, douleurs du dos, douleurs dentaires, douleurs rhumatismales et musculaires, il est prescrit également en cas de rhume et dans les états fébriles.

## ATTENTION !

### DANS QUELS CAS NE DEVEZ-VOUS PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ne pas prendre ce médicament si :

-Vous avez une Allergie connue au paracétamol, à la caféine ou à un autre constituant de ce médicament,

-Enfants moins de 12 ans.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

-Ce médicament contient du Paracétamol, par conséquent éviter de l'associer avec d'autres médicaments en contiennent ;

-Consultez votre médecin avant de prendre ce médicament si vous souffrez d'une maladie grave du foie et des reins.

-Ne pas prendre ce médicament plus de 10 jours.

-Si les douleurs ou la fièvre persistent plus de 03 jours malgré la prise régulière de ce médicament, consultez votre médecin.

-Tenir hors de la portée des enfants.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

Les effets de ce médicament sur le foie peuvent être augmentés par la prise d'alcool et/ou l'utilisation concomitante de certains médicaments qui peuvent augmenter le métabolisme hépatique du PACET EXTRA comme les barbiturates et les antidépresseurs tricyclique ;

L'effet anticoagulant de la Warfarine ou des autres anticoagulants peut être augmenté par la prise journalière prolongée du PACET EXTRA, ce qui favorise le risque de saignement,

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout autre traitement en cours en particulier Dompéridone, Metoclopramide ou Colestyramine.

## COMMENT DEVEZ VOUS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

### •Posologie :

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans ;

La dose journalière recommandée est de deux comprimés, quatre fois par jour, en respectant toujours un intervalle de 04 heures entre les prises

Ne pas prendre plus de 08 comprimés par jour.

### •Mode et voie d'administration :

Voie orale ;

Les comprimés sont à avaler avec un demi-verre d'eau.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

### Grossesse :

il n'est pas recommandé d'utiliser ce médicament pendant la grossesse sans avis médical.

### Allaitement :

l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement.

## QUELS SONT LES EFFETS NON SOUHAITÉS ET GENANTS DE CE MÉDICAMENT ?

Comme tout médicament, PACET EXTRA peut provoquer des effets plus ou moins gênant tels :

- Une réaction allergique : éruption cutanée ou nécrolyse épidermique toxique
- Thrombocytopénie, Agranulocytose
- Difficultés respiratoire et troubles hépatiques.

D'autres effets secondaires liés à la caféine peuvent apparaître comme : Nervosité et Vertige.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## SI VOUS AVEZ UTILISÉ UNE DOSE PLUS IMPORTANTE QUE VOUS N'AURIEZ DÛ :

En cas de surdosage, avertir immédiatement votre médecin, même si vous vous sentez bien, car il ya des risques de lésions hépatiques qui apparaissent tardivement (au bout de 48 heures à 72 heures).

## CONDITIONS DE CONSERVATION :

-À conserver à une température ne dépassant pas 30°C° à l'abri de l'humidité.

-Tenir hors de la portée des enfants

-Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Fabriquant, conditionneur et détenteur de la DE

laboratoire

Industrie  
**Neomedic**  
Pharmaceutique

10, Zl. le Palma - Constantine - Algérie.

ومُضادَاتُ الأَكْتَبَابِ الثَّلَاثِيَّةِ الحَلَقَاتِ من زيادة تأثير  
باسات اكسترا على الكبد،  
الخاصية المضادة للتجلط للوارفارين أو مضادات  
التجلط الاخرى يمكن أن تزيد بالتناول اليومي  
و المستمر لهذا الدواء، مما يزيد من خطر النزيف.  
يجب إعلام الطبيب أو الصيدلاني بأي دواء آخر  
تتناولونه خصوصا اذا تعلق الأمر بدُومِبرِيدُون،  
ميتوكلوبراميد أو الكوليستيرامين.

### كيفية استعمال هذا الدواء: المقادير:

يوصف هذا الدواء للبالغين و الأطفال الذين تزيد  
أعمارهم عن 12 سنة،  
الجرعة اليومية المنصوح بها هي قرصين أربع مرات  
باليوم، مع مراعاة فترة 04 ساعات بين جرعة و أخرى،  
لا يجب تناول أكثر من 08 أقراص باليوم.

### طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم،  
تؤخذ الأقراص مع نصف كأس من الماء.

### الحمل والإرضاع:

الحمل:  
يوصى بعدم تناول هذا الدواء أثناء فترة الحمل.  
الرضاعة:  
لا ينصح باستعمال هذا الدواء أثناء فترة الرضاعة.

### ماهي الآثار المزعجة و غير المرغوب فيها لهذا الدواء؟

يمكن أن يؤدي هذا الدواء إلى ظهور تأثيرات مزعجة  
ك:  
-تفاعل حساسية: طفح جلدي، تقشُّر الأنسجةِ  
المتُمَوِّتَةِ البَشْرِيَّةِ التَّسْمِي.   
-قَلَّةُ الصَّفِيحَاتِ، نَدْرَةُ المَحَبَّاتِ.  
-صعوبة في التنفس، خلل في الكبد.  
-يمكن أن تلاحظ آثار جانبية أخرى مرتبطة بالكافيين  
كالعصبية و الدوخة.  
-في حالة ظهور أعراض أخرى، اعلموا طبيكم  
أو الصيدلي الذي تتعاملون معه.

### شروط الحفظ:

يحفظ هذا الدواء تحت درجة حرارة أقل من 30 م°.  
يجب عدم تجاوز تاريخ الصلاحية المدون على الغلاف.  
يجب عدم تجاوز تاريخ الصلاحية المدون على الغلاف

### التعريف بالدواء:

التكوين الكمي: يحتوي كل قرص على:

باراسيتامول.....500 مغ  
كافيين ..... 65مغ  
سـوـاـغ..... ك ك

### التكوين النوعي:

المادة الفعالة: باراسيتامول & كافيين.  
السواغ: كروسوفيدون، سلولوز بلوري مكروي،  
ستيارات المغنيزيوم، ايروزل، بوفيدون.

### الشكل الصيدلاني:

علبة تحتوي على 16 قرص.

### الفئة الصيدلانية العلاجية:

مسكن للألم و مضاد للحمى.

### ماهي الحالات التي يستعمل فيها هذا الدواء ؟

يستعمل باسات اكسترا من أجل تسكين الآلام الخفيفة  
و المتوسطة كالصداع، الشقيقة، التهاب الحلق، ألم  
بالظهر، ألم بالأسنان، ألم الروماتيزم و ألم العضلات،  
كما يوصف أيضا في حالات الزكام و الحمى.

### حذار!

ماهي الحالات التي يمنع فيها استعمال هذا الدواء؟  
لا يمكن استعمال هذا الدواء في حالة:  
حساسية معروفة اتجاه الباراسيتامول، الكافيين  
أو أحد مكونات هذا الدواء.  
الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة.

### احتياطات الاستعمال :

-هذا الدواء يحتوي على الباراسيتامول، و لذلك يجب  
عدم تناول الأدوية الأخرى التي من الممكن أن تحتوي  
عليه،  
-اذا كنتم تعانون من أمراض خطيرة بالكبد أو بالكلية،  
فيجب عليكم إعلام الطبيب قبل تناول هذا الدواء،  
-لا تتناولوا هذا الدواء لمدة تزيد عن 10 أيام،  
-اذا استمرت الآلام أو الحمى لأكثر من 03 أيام على  
الرغم من التناول المنتظم لهذا الدواء، يجب استشارة  
الطبيب،  
-يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.

### تداخل أثر الدواء مع أدوية أخرى و تفاعلاتها:

يمكن أن يزيد تناول الكحول أو التناول المتواقت لهذا  
الدواء مع أدوية أخرى تزيد من أفضه كالبأربيتورتات